1) Показателями здоровья населения являются:

2) Перечислите качественные показатели, характеризующие эпидемическую заболеваемость:

3) Источником инфекции по определению Л.В. Громашевского:

4) Как называется иммунитет, формируемый после введения анатоксина:

5) Основной руководящий документ, направленный на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в РФ:

6) Руководящий документ, регламентирующий проведение профилактических прививок военнослужащим в мирное время:

7) Оптимальный температурный режим хранения вакцин:

8) В основе деления инфекционных болезней на антропонозы, зоонозы и сапронозы лежит:

9) Наличие зонального нозоареала определяется:

10) При зоонозах человек:

11) Возможность реализации воздушно-пылевого пути передачи:

12) За совершение санитарных правонарушений должностные лица и граждане РФ могут быть привлечены к ответственности:

13) Для обоснования эпидемиологического диагноза в ЧС необходимы материалы, характеризующие:

14) Природным очагом инфекционной болезни считают:

15) Неравномерность распределения убиквитарных инфекций преимущественно определяется:

16) Тенденция многолетней динамики заболеваемости в первую очередь определяется:

17) Наличие типичной для отдельных инфекций цикличности определяется:

18) К поствакцинальной реакции относят:

19) Тяжелые реакции на предыдущую прививку данной вакциной являются абсолютным противопоказанием против иммунизации:

20) Коллективный иммунитет считается достаточным для обеспечения защиты населения при иммунной прослойке, начиная с:

21) Эпидемиология инфекционных болезней - это наука:

22) Предвестниками осложнения эпидситуации при кишечных инфекциях на пищевых предприятиях могут быть:

23) При хранении живой вакцины при комнатной температуре происходит:

24) Бактериофаг следует хранить:

25) К инфекциям, управляемым санитарно-гигиеническими мероприятиями, относятся:

26) Выберите один из 5 вариантов ответа:

27) Заболеваемость считается стабильной при значении темпа прироста:

28) Для разрыва механизма передачи инфекции проводятся:

29) Больной коклюшем наибольшую эпидемическую опасность представляет в:

30) Больной краснухой заразен для окружающих:

31) У привитого против дифтерии носительство возбудителя развивается по следующим причинам:

32) Наиболее частая продолжительность инкубационного периода при холере:

33) Максимальная длительность инкубационного периода при пищевых токсикоинфекциях составляет:

34) При выявлении больного холерой среди пассажиров самолета из перечисленных мероприятий не проводится:

35) Основными источниками туляремийной инфекции являются:

36) Продолжительность иммунитета после вакцинации чумной вакциной:

37) При сыпном тифе имеют место следующие пути передачи сыпного тифа:

38) Лихорадка Ласса представляет эпидемиологическую опасность для медицинского персонала, так как передается:

39) ВИЧ в высохшей крови сохраняется:

40) Риск заражения при однократном половом контакте с ВИЧ-инфицированным составляет:

41) HbsAg впервые появляется в крови у больного острым гепатитом В:

42) Попадание в рану человека загрязненной почвы может явиться причиной заболевания:

43) Продукты, контаминированные возбудителями псевдотуберкулеза:

44) Заражение человека легионеллами осуществляется:

45) При уколе или порезе медицинского работника инструментом, контаминированным кровью пациента, необходимо:

46) Кто отвечает за организацию противоэпидемического режима в лечебно-профилактическом учреждении:

47) У ребенка на 15 день пребывания в терапевтическом отделении обнаружена скарлатина. Данный случай является:

48) Кто занимается контролем за противоэпидемическим режимом в лечебно-профилактическом учреждении:

49) Появление случаев чумы среди личного состава части подразумевает введение следующих режимно-ограничительных мероприятий:

50) Основной руководящий документ, обеспечивающий санитарно-эпидемиологическое благополучие в ВС РФ:

51) Термин "феномен айсберга" в эпидемиологии означает:

52) Главная диагностическая задача при расшифровке вспышек кишечных инфекций заключается в:

53) На какие инфекции распространяются международные медико-санитарные правила:

54) Какое транспортное средство считается подозрительным при заражении чумой:

55) С какой периодичностью проводятся заседания санитарно-противоэпидемической комиссии:

56) Как поступить с иностранным гражданином, прибывшим из эндемичного очага желтой лихорадки:

57) Какая клиническая форма чумы возникает при проникновении возбудителя через поврежденную кожу:

58) Максимальный срок хранения приготовленных питательных сред в чашках Петри:

59) К возбудителям клещевого энцефалита относятся:

60) Средой для определения стерильности являются:

61) К спирохетам относятся:

62) Разложение лактозы с образованием кислоты и газа вызывают:

63) Дифференциально-диагностической средой для идентификации холерного вибриона является:

64) Рекомендуемое соотношение белков, жиров и углеводов в рационе питания взрослого человека:

65) В "нормальной" кишечной микрофлоре анаэробные бактерии составляют:

66) Наибольшее количество бактерий в организме человека сосредоточено:

67) Из культурально-биологических свойств коринебактерий дифтерии наибольшее эпидемическое значение имеют:

68) Какие ферменты инактивируют антибиотики пенициллинового и цефалоспоринового ряда:

69) Сахаром, являющимся специфическим для молока, является:

70) Наиболее характерное место локализации синегнойной инфекции у ожоговых больных:

71) Допустимое число микробного обсеменения воздуха в операционной до начала работы:

72) Для экстренной профилактики в очаге холеры назначают следующие препараты:

73) Какие питательные среды используются для культивирования патогенных лептоспир:

74) Для бактериологического исследования крови у взрослого необходимо посеять материала не менее:

75) При исследовании спинномозговой жидкости и передачи материала для посева необходимо поддерживать температуру:

76) Среда Сабуро для выявления микроскопических грибов имеет pH:

77) Для выявления теста на "каталазу" используют реактив:

78) Облигатным признаком патогенных энтеробактерий является отсутствие ферментаци:

79) К облигатным внутриклеточным паразитам относятся:

80) Осложнения часто вызываемые Bacteroides fragilis:

81) Постоянство химического состава воды характерно для водоисточников:

82) грунтовыхПотребность в кальции для взрослого человека составляет (мг):

83) Предварительная оценка профессионального риска осуществляется:

84) При выборе источника для централизованного питьевого водоснабжения наибольшее предпочтение отдается водам:

85) При недостаточной освещенности рабочих поверхностей может возникнуть:

86) При организации технологических процессов, создающих шум, следует предусматривать применение средств:

87) При существенном сокращении жиров в рационе питания возникает риск снижения общего поступления и усвояемости:

88) При трехразовом питании военнослужащих интервал между приемами пищи допускается:

89) Продуктами, представляющими основные источники углеводов, являются:

90) Профессиональное заболевание - это острое или хроническое заболевание, возникшее:

91) Рыбные пресервы, в отличие от консервов:

92) Санитарно-эпидемиологическое заключение имеет право выдавать:

93) Световой коэффициент показывает отношение:

94) Средства индивидуальной защиты от воздействия ЭМИ радиочастотного диапазона:

95) Существенно напряженная медико-экологическая ситуация характеризуется:

96) В проектируемых жилых зданиях среднегодовая эквивалентная равновесная объёмная активность дочерних продуктов распада радона и торона не должна превышать:

97) В соответствии с суточными нормами общевойскового пайка в условиях умеренного климата при трёхразовом питании на завтрак должно приходиться (%):

98) Вклад и значение для жителей региона вредных факторов, равномерно распределенных по территории региона, могут быть оценены путем:

99) Воздействие вредного производственного фактора на работника может привести к:

100) Время, в течение которого активность радионуклида в организме уменьшается вдвое, называется:

101) Выраженность (тяжесть) детерминированного соматического эффекта:

102) Гельминтозом, способным передаваться человеку с мясом животных является:

103) Гигиенические требования к конструкции детской обуви определяются:

104) Гигиенический норматив инсоляции жилых помещений и территории жилой застройки обоснован:

105) Группа испытуемых для проведения производственных физиологических исследований должна быть однородна по:

106) Дефицит ретинола является фактором риска, и способствует развитию

107) Для военнослужащих рекомендуемая в суточном рационе доля белков животного происхождения от общего их количества составляет:

108) Для динамического наблюдения за температурой воздуха в помещении используют:

109) Для защиты от ионизирующего излучения при работе на палатных рентгеновских аппаратах персонал может использовать:

110) Для мытья столовой посуды на пищеблоке детского сада должна быть моечная ванна:

111) Камеры для хранения пищевых отходов должны иметь:

112) Класс источника централизованного питьевого водоснабжения устанавливается:

113) Коэффициент естественной освещенности - это:

114) Для определения показателей влажности воздуха в помещении используют:

115) Лечебно-профилактическим называется питание лиц:

116) Мерами административного взыскания, применяемыми представителями санитарно-эпидемиологической службы, являются:

117) Для определения степени закаленности организма не используется методика:

118) Для получения показателей и данных социально-гигиенического мониторинга по разделу "гигиена труда" в качестве единицы наблюдения выбирают:

119) Доказанный канцерогенный эффект солнечной радиации характерен для рака:

120) Документ, регламентирующий минимальную температуру воздуха в спальном помещении для военнослужащих:

121) Естественное освещение измеряется в:

122) Задача первого этапа санитарно-эпидемиологической экспертизы партии пищевой продукции - это оценка соответствия:

123) Запрещается сбрасывать в водные объекты сточные воды:

124) Злокачественные новообразования у человека, обусловленные воздействием ионизирующих излучений, относятся к эффектам:

125) Источниками загрязнения объектов окружающей среды искусственными радионуклидами являются:

126) К закономерностям роста и развития организма детей не относится:

127) К объективным признакам утомления относят:

128) Методическими указаниями (МУ) называют

129) Основной задачей организации ЗСО для поверхностного источника питьевого водоснабжения является:

130) Основной причиной значительного накопления (за счёт интенсивного размножения) бактерий в пищевых продуктах является несоблюдение:

131) Основными источниками витаминов группы "В" являются:

132) Оценка эпидемиологической безопасности питьевой воды из поверхностного источника питьевого водоснабжения проводится по показателям:

133) Пищевыми продуктами, являющимися в питании человека основными источниками токоферолов (витамина е), являются:

134) Подавляющее число случаев ботулизма связано с употреблением в пищу:

135) Размер 1 пояса ЗСО подземного источника водоснабжения зависит от:

136) Расследование случая хронического профессионального заболевания (отравления) с момента получения извещения об установлении заключительного диагноза органами роспотребнадзора должно проводиться в течение (день):

137) Регламентация органолептических показателей качества питьевой воды обеспечивает:

138) Углеводы в организме человека являются:

139) Укажите норматив доброкачественности питьевой воды по запаху в полевых условиях размещения войск, не более, балл:

140) Содержание остаточного хлора в воде нормируется:

141) Укажите рекомендованную величину светового коэффициента для жилых помещений казармы:

142) Укажите частоту проведения проверки знаний военнослужащими правил безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения:

143) Укажите, нормативный уровень подвижности воздуха в казарменном помещении:

144) Условиями, способствующими разрушению витамина "с" в продуктах, являются:

145) Формы протоколов результатов лабораторных и инструментальных исследований в рамках экспертиз и расследований утверждает:

146) Сроки предоставления внеочередных донесений о случаях - групповых профессиональных острых отравлений:

147) Энергия суточного рациона взрослого здорового человека должна полностью компенсировать:

148) Укажите санитарный норматив доброкачественности питьевой воды по запаху в полевых условиях, балл:

149) Укажите диапазон ИМТ для военнослужащих в возрасте 18-25 лет, соответствующий пониженной массе тела:

150) Санитарным показателем эффективности работы вентиляции помещений жилых и общественных зданий служит:

151) Рыба может быть источником глистной инвазии:

152) Укажите определение термина "ЗДОРОВЬЕ", рекомендованное Всемирной Организацией Здравоохранения:

153) Механизм передачи - это:

154) Кто является основателем учения о природной очаговости инфекционных заболеваний:

155) Предложенная Л.В. Громашевским классификация инфекционных болезней основана на:

156) При трансмиссивных зоонозах заболеваемость:

157) При сапронозах заболеваемость:

158) Эпидемиология изучает болезни и здоровье человека на следующих уровнях:

159) Термином "эндемичность" определяется:

160) Убиквитарными называют инфекции:

161) Укажите, как поступить с использованным одноразовым медицинским инструментарием:

162) Для промышленной стерилизации изделий медицинского назначения применяют

163) На какую стадию развития членистоногих направлено действие ларвицидов:

164) На какую стадию развития членистоногих направлено действие овоцидов:

165) На какую стадию развития членистоногих направлено действие имагоцидов:

166) На какое звено эпидемического процесса направлена дератизация:

167) Целью проведения санитарно-технических дератизационных мероприятий является:

168) Целью проведения санитарно-гигиенических дератизационных мероприятий является:

169) На какое звено эпидемического процесса направлена иммунопрофилактика:

170) Эпидемиологическая диагностика это:

171) Мероприятия, направленные на механизм передачи антропонозных инфекций:

172) Активированные растворы хлорсодержащих препаратов используют в следующие сроки:

173) Формирование природного очага происходит при:

174) Из методов дезинсекции наиболее выраженной специфичностью действия обладает метод:

175) Контроль изделий на стерильность осуществляется методом:

176) Наибольшую эпидемическую опасность представляют больные с формами заболевания:

177) Наблюдение за эпидемическим очагом следует закончить:

178) Вспышка инфекционного заболевания - это:

179) Выберите мероприятия, направленные на источник инфекции при антропонозах:

180) Критерием объективной оценки качества иммунопрофилактики является:

181) Ликвидация той или иной инфекционной болезни, как нозологической формы означает:

182) Необходимость назначения дезинфекции при различных инфекционных заболеваниях определяется:

183) Основным способом профилактики дифтерии является:

184) Для внутригодовой динамики заболеваемости гриппом характерно:

185) Потенциально эффективное противоэпидемическое мероприятие при стрептококковой инфекции:

186) В городе - авария канализационной сети, в результате чего произошел подсос канализационных вод в водопроводную сеть. Следствием случившегося может быть рост числа случаев заболеваний:

187) Больной желтой лихорадкой при отсутствии комаров-переносчиков:

188) Наиболее важными факторами передачи сальмонелл являются:

189) В очаге сибирской язвы лицам, включенным в группу риска заражения, показаны:

190) Источниками ВИЧ-инфекции являются инфицированные в:

191) На какой срок, как правило, устанавливается карантин:

192) Какие заболевания относят к природно-очаговым бактериальным инфекциям:

193) Какие термины используются для оценки санитарно-эпидемиологического состояния:

194) Какие морфологические структуры и особенности их строения обусловливают отношение к окраске по Граму:

195) Какой тип изменчивости наблюдают при мутациях у бактерий:

196) Укажите наиболее распространённый метод окраски возбудителя туберкулёза:

197) Какие кокковидные бактерии способны синтезировать каталазу:

198) Укажите как реагируют пневмококки (Streptococcus pneumoniae) на наличие в среде культивирования жёлчи:

199) Какое лабораторное животное используют для выделения пневмококка:

200) Облигатным признаком патогенных энтеробактерий является отсутствие ферментации:

201) Для бактериологического исследования крови у детей необходимо посеять материала не менее:

202) Аэрацией производственных помещений является:

203) Биологические вредные производственные факторы являются причиной:

204) Болезнь "Бери-бери" развивается за счёт недостатка витамина:

205) В личные медицинские книжки работников пищевых объектов вносят данные:

206) В понятие "Режим дня" входит распределение времени:

207) В условиях нагревающего микроклимата организм теряет минеральные соли преимущественно с:

208) Витамином, принимающим участие в кроветворении, является витамин:

209) Вода должна быть питьевого качества:

210) Военнослужащему ставится диагноз "недостаточное питание" если за месяц потеря массы тела превышает:

211) Военнослужащие с диагнозом "пониженное питание" в течение первого месяца проходят контрольное взвешивание с периодичностью:

212) Врач по гигиене труда обязательно привлекается в состав комиссии по расследованию при возникновении на производстве:

213) Выберите пример комплексного действия вредных факторов на военнослужащих:

214) Гельминтоз человека, связанный с употреблением зараженного мяса:

215) Гигиеническая оценка инсоляции помещений и участков территории микрорайона дается на основе определения:

216) Гигиенические критерии оценки условий труда - это показатели, позволяющие оценить:

217) Государственная система наблюдения, анализа и оценки показателей здоровья населения и состояния среды обитания является:

218) Государственная экспертиза условий труда состоит в оценке:

219) Дезактивация воды направлена на освобождение от:

220) Диетическое питание военнослужащим назначается на срок:

221) Длительное охлаждение во влажной среде, сочетающееся с неполным согреванием стопы, приводит к образованию:

222) Для военнослужащих мужчин в возрасте 18 - 25 лет нормальным считается процентное содержание жира в теле:

223) Для динамического наблюдения за относительной влажностью воздуха в помещении используют:

224) Для достижения нормируемых параметров микроклимата открывающиеся ворота, двери и технологические проёмы необходимо оборудовать:

225) Для обеспечения благоприятных условий терморегуляции при высокой температуре воздуха в помещении необходимо создать:

226) Для предотвращения загрязнения окружающей среды транспортировка высокоактивных радионуклидов должна осуществляться:

227) Для предупреждения поражения щитовидной железы радиоактивным йодом применяют:

228) Для учёта биологической эффективности разных видов ионизирующего излучения для человека используется:

229) Документ, регламентирующий водопотребление военнослужащих в полевых условиях:

230) Документ, с помощью которого расчетным методом могут быть определены химический состав и энергетическая ценность продуктов питания общевойскового пайка:

231) Доля животных белков в питании взрослого здорового человека должна составлять от общего белка (%):

232) Допустимая продолжительность учебных занятий курсантов (студентов старших курсов) на ПЭВМ не более:

233) Допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхностей рабочих помещений и находящегося в них оборудования, кожных покровов, спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты определены в:

234) Единица измерения относительной влажности воздуха:

235) Единицей измерения светового потока является:

236) Единицы измерения эквивалентной дозы ионизирующего излучения:

237) За санитарно-эпидемиологическое благополучие военнослужащих отвечает:

238) Информация о состоянии здоровья населения поступает в федеральный информационный фонд из:

239) Истинный бомбаж консервов возникает вследствие:

240) К детерминированным биологическим эффектам действия ионизирующих излучений у человека относят:

241) К мероприятиям специфической профилактики высотной болезни относят:

242) К пищевым отравлениям немикробной природы относят:

243) К санитарно-показательным микроорганизмам в водной среде относятся:

244) К средствам радиационной защиты в рентгенологическом кабинете не относят:

245) Какой объём воздуха в 1 час должен подаваться на 1 военнослужащего в спальном помещении:

246) Критическая медико-экологическая ситуация характеризуется:

247) На предприятии общественного питания запрещается изготовление:

248) Назначение гигиенических нормативов (ГН):

249) Назовите ПДК диоксида углерода в воздухе спальных помещений казармы, процент:

250) Наиболее опасными при поступлении в организм являются радиоизотопы, распадающиеся по типу:

251) Обязательные предварительные медосмотры для устраивающихся на предприятие с вредными условиями труда проводят с целью:

252) Основанием получения дополнительного питания военнослужащими, имеющими рост 190 см и выше является:

253) Основным принципом лечебного питания является:

254) Оценка эпидемиологической безопасности питьевой воды из подземного источника водоснабжения проводится по показателям:

255) По результатам государственного контроля (надзорза обеспечением безопасных условий труда на предприятии:

256) Что из перечисленного относится к профилактической дезинфекции:

257) Что из перечисленного относится к заключительной дезинфекции:

258) Что из перечисленного относится к текущей дезинфекции:

259) Организация и проведение мероприятий по ликвидации эпидемических очагов с единичным заболеванием является обязанностью:

260) Перед выездом в учебный центр следует провести внеочередной медицинский осмотр и бактериологическое обследованиеВыберите один из 3 вариантов ответа:

261) Руководящий документ, регламентирующий проведение прививок по эпидемическим показаниям военнослужащим ВС РФ:

262) Укажите прибор для отбора проб воды в полевых условиях размещения войск:

263) Размещение амбулаторно-поликлинических медицинских организаций мощностью не более 100 посещений в смену:

264) Сколько раз в сутки регистрируется температура воздуха в спальном помещении казармы:

265) Содержание вредных химических веществ в помещениях, где работа военнослужащих на ПЭВМ является основной, не должно превышать:

266) Социально-гигиенический мониторинг организуют:

267) Укажите категорию военнослужащих, подлежащих предварительным медицинским осмотрам:

268) Укажите цель проведения периодических медицинских осмотров военнослужащих:

269) Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в области гигиены труда - это деятельность по:

270) Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника, называют:

271) Санитарное состояние солдатской столовой признается неудовлетворительным, а ее эксплуатация может приостанавливаться в случае обнаружения:

272) С повышением скорости движения воздуха возрастает теплоотдача организма путём:

273) Потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильным действием персонала, стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к облучению людей выше установленных норм или радиоактивному загрязнению окружающей среды, представляет собой:

274) Интервалом индекса массы тела взрослого человека, характеризующим нормальную массу тела, является:

275) Укажите определение термина "Здоровье", рекомендованное Всемирной Организацией Здравоохранения:

276) Предметом изучения эпидемиологии является:

277) Для установления ориентировочного времени возможного заражения необходимо из даты заболевания вычесть продолжительность периодов:

278) Уровень популяционного иммунитета определяется слагаемым:

279) Условиями развития эпидемического процесса являются факторы:

280) Холодовая цепь - система, включающая:

281) Основной задачей дератизации является:

282) Возбудителями зоонозов являются:

283) При антропонозах человек:

284) Для поддержания эпидемического процесса необходимы:

285) Интенсивные показатели используются в эпидемиологии для изучения:

286) Основным положением теории Е.Н. Павловского является:

287) Методы, которые не используются для проведения стерилизации:

288) Из перечисленных характеристик макроорганизма имеет решающее значение с позиции развития эпидемического процесса:

289) Как поступить, если число средних и сильных реакций при вакцинации одной серией вакцины достигает 18% и более:

290) Как решить был ли заморожен адсорбированный вакцинный препарат:

291) При перевозке вакцины в сумке - холодильнике хладагенты размещают:

292) В контейнере - холодильнике полностью растаял лед в холодильных элементах, с этого момента прошло 12 часов. Какие вакцинные препараты стали не пригодными:

293) Защитное действие фага, введенного в организм, сохраняется:

294) Ликвидация той или иной инфекционной болезни в глобальном масштабе означает:

295) Во время осуществления контроля работы воздушного стерилизатора произошло расплавление наполнителя в химических тестах (индикаторы плавления) это указывает:

296) Эндемические инфекционные болезни - это:

297) На какое звено эпидемического процесса преимущественно влияют природные факторы:

298) Контактно-бытовой путь передачи возбудителей характеризуется:

299) К инфекциям, управляемым средствами иммунопрофилактики, относятся в основном:

300) Наибольшую потенциальную эффективность иммунопрофилактика имеет:

301) Химические вакцины по сравнению с убитыми вакцинами обладают:

302) Возможность прививки лицам, общавшимся с больными, определяется:

303) Тенденция многолетней динамики проявляется в том, что она показывает:

304) При проведении прививок гражданин РФ:

305) Прогностическим признаком эпиднеблагополучия по дифтерии является изменение:

306) Этиологическими агентами инфекций, вызывающих "диарею путешественников", являются штаммы E.coli:

307) Ведущим этиологическим агентом 7 пандемии холеры является:

308) Переносчиками возбудителя желтой лихорадки являются:

309) Международный карантин при желтой лихорадке составляет:

310) Из перечисленных видов опасен в эпидемическом отношении:

311) Сезонный подъем заболеваемости бруцеллезом связан:

312) ГЛПС человек может заразиться:

313) На какой срок помещаются в изолятор выявленные инфекционные больные:

314) В какой срок должна проводиться заключительная дезинфекция:

315) К инфекциям, при которых наиболее действенны мероприятия, направленные на восприимчивость организма, относятся:

316) К инфекциям, при которых наиболее действенны мероприятия, направленные разрыв механизма передачи, относятся:

317) Дезинфекция высокого уровня - это:

318) Четвертый тип противочумного костюма надевается при работе в очаге:

319) Для ревакцинации против столбняка и дифтерии в плановом порядке военнослужащим можно рекомендовать:

320) Понятие "санитарная охрана территории страны" включает:

321) Для экстренной профилактики в очаге холеры назначают препараты:

322) На наличие воспалительного процесса у больного при посеве мочи указывает следующая степень бактериурии:

323) Клеточная стенка имеется у:

324) Рост возбудителя бруцеллёза из клинического материала можно получить на питательной среде через:

325) Более 90% генерализованных форм менингококковой инфекции вызывают штаммы серогрупп:

326) В каком методе экспресс-диагностики используют олигонуклеотидные праймеры:

327) Кариес у людей вызывают:

328) Для лечения "Синдрома токсического шока", вызываемого стафилококками, применяются:

329) Формирование микрофлоры организма заканчивается:

330) В повышении защитных сил организма ребенка особую роль играет витамин:

331) В суточные энерготраты военнослужащих входит все указанные показатели, кроме:

332) Все работы с открытыми источниками ионизирующих излучений подразделяются на следующее число классов:

333) Для определения скорости воздуха в выходных отверстиях приточной вентиляции используют:

334) Допустимая концентрация (ПДК) диоксида углерода для жилых помещений, процент:

335) Допустимыми считаются условия труда, при которых:

336) Единицей измерения яркости является:

337) Заболевания, которые могут возникнуть у человека при употреблении мяса от больных животных:

338) Запрещается сбрасывать в водоемы стоки:

339) Запрещается сбрасывать в водоемы стоки, содержащие:

340) Иксодовые клещи являются специфическими переносчиками возбудителей:

341) К группе технологических мероприятий по санитарной охране почвы относят:

342) К соматометрическим показателям, определяющим статус питания военнослужащего, относятся все перечисленные, кроме:

343) Какие способы уменьшения степени воздействия теплового излучения на военнослужащих являются наиболее эффективными:

344) применение коллективных способов защитыКаким документом регламентируются требования к доброкачественности питьевой воды в полевых условиях размещения войск:

345) Конвекцией называется:

346) Кратность воздухообмена, регламентируемая Уставом в спальном помещении военнослужащих:

347) Лечебно-профилактическое питание военнослужащих по призыву осуществляется путем:

348) Лечебно-профилактическое питание предназначено для:

349) Медицинские организации психиатрического, инфекционного, в том числе туберкулезного, профиля располагают от территории жилой застройки на расстоянии не менее (м):

350) Методами защиты от внешнего гамма-излучения являются:

351) Методическими рекомендациями (МР) являются:

352) Мясо содержит биодоступный минеральный элемент:

353) Назовите наиболее вероятное условие развития близорукости у школьников:

354) Наиболее рациональной с гигиенической точки зрения системой искусственного освещения является система:

355) Наибольшее гигиеническое значение имеют:

356) Недостаток белков в пище может привести в организме ко всему нижеперечисленному, кроме:

357) Облучение эффективной дозой свыше 200 м3в в течение года должно рассматриваться как:

358) Основной обмен веществ - это расход энергии на:

359) Основной формой гигиенического воспитания является:

360) Основным источником микробного загрязнения воздуха в жилых помещениях для военнослужащих является:

361) Основным принципом нормирования содержания вредных химических веществ в окружающей среде является принцип:

362) Основными гигиеническими требованиями к рациональному искусственному освещению являются:

363) Относительная влажность показывает:

364) Первым этапом мероприятий по надзору является:

365) Пищевым продуктом, с которым связывают возникновение ботулизма, является:

366) Планируемое облучение в эффективной дозе до 100 м3в в год допускается с

разрешения:

367) Под коэффициентом естественного освещения понимают отношение:

368) Под относительной влажностью понимают:

369) Под световым коэффициентом понимают:

370) Показатель, косвенно свидетельствующий о степени освобождения питьевой воды от вирусов при её обработке:

371) Преимущественное действие бензола на организм военнослужащего:

372) Приготовление пищи для каждой смены питающихся в войсковой столовой производится раздельно, если перерывы между ними:

373) Принцип оптимизации радиационной безопасности при проведении рентгенологических исследований предполагает:

374) Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) регламентируется:

375) Производственные помещения и цеха солдатской столовой запрещается размещать:

376) Профессиональный риск - это вероятность:

377) Режимы применения респираторов устанавливаются с учётом:

378) Рекомендуемые интервалы между приёмами пищи у взрослого здорового человека (час):

379) Селитебную территорию следует размещать относительно производственной:

380) Средняя масса блюда на раздаче может отклоняться от нормы не более, чем на (%):

381) Суммарное время регламентированных перерывов для операторов ПЭВМ устанавливается в зависимости от:

382) Температура хранения большинства скоропортящихся продуктов (°С):

383) Термин "Работа с источником ионизирующего излучения" означает все виды:

384) Удельный минимальный объем воздуха (помещения), регламентируемый Уставом для военнослужащих в спальном помещении, куб.м:

385) Укажите гигиенический норматив относительной влажности воздуха в жилом помещении казармы:

386) Укажите основной нормативный правовой акт, регулирующий отношения в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия военнослужащих РФ: